




■対象年齢：○歳(○か月)未満とは、○歳(○か月)になる前日まで接種可能です。
 ※標準接種期間・間隔を過ぎてても対象年齢内であれば、予診票を利用し無料で接種できます。

■異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔：
 「注射の生ワクチン(生)」を接種後に、「注射の生ワクチン(生)」を接種するときは、27日以上の間隔をおいてください。

◀接種間隔の考え方▶



種類	対象年齢	標準的な接種期間	接種回数	接種間隔(赤字は最短の接種期間)・その他
ロタウイルス	ロタリックス(1価)	出生6週0日~24週0日まで	2回	【1・2回目】 27日以上の間隔をおく
	ロタテック(5価)	出生6週0日~32週0日まで	3回	【1・2・3回目】 27日以上の間隔をおく
B型肝炎	1歳未満	生後2か月~9か月未満	3回	【1・2回目】 27日以上の間隔をおく 【3回目】 1回目の接種から139日以上の間隔をおく
小児肺炎球菌感染症 <small>※接種開始時期により接種回数異なります。</small>	生後2か月~5歳未満	【標準】 初回開始が生後2か月~7か月未満	計4回 初回3回 追加1回	【1・2・3回目】 27日以上の間隔をおく(標準：1歳未満) ※2回目および3回目が2歳を超えた場合は行わない。2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない。(いずれも追加接種は可) 【4回目】 初回3回目終了後、60日以上の間隔をおいて、かつ、1歳以降(標準：1歳~1歳3か月未満) ※初回接種が3回接種できなくても、追加接種は実施可能。その際は、初回接種の接種終了後60日以上の間隔をおく。
		7か月未満をすぎた場合 初回開始が生後7か月~1歳未満	計3回 初回2回 追加1回	【1・2回目】 27日以上の間隔をおく(標準：1歳未満) ※2回目が2歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可) 【3回目】 初回2回目終了後、60日以上の間隔をおいて、かつ、1歳以降(標準：1歳~1歳3か月未満) ※初回接種が2回接種できなくても、追加接種は実施可能。その際は、初回1回目の接種終了後60日以上の間隔をおく。
	7か月未満をすぎた場合 初回開始が1歳~2歳未満	2回	【1・2回目】 60日以上の間隔をおく	
	7か月未満をすぎた場合 初回開始が2歳~5歳未満	1回		
5種混合 (R6.4.1~) (ジフテリア・破傷風 百日せき・ポリオ ヒブ)	生後2か月~7歳6か月未満	初回接種が生後2か月~生後7か月未満	計4回 初回3回 追加1回	【1・2・3回目】 20日以上(標準：20~56日)の間隔をおく 【4回目】 1期初回3回目終了後、6か月以上(標準：6か月~1年6か月未満)の間隔をおく
		1期初回3回接種後6か月~1年半の間隔をおいて1回		
ヒブ <small>※接種開始時期により接種回数異なります。 ※令和6年4月1日から5種混合ワクチンが始まりましたが、ヒブワクチンを単独で接種開始している場合、原則、同一のワクチンで接種を完了してください。</small>	生後2か月~5歳未満	【標準】 初回開始が生後2か月~7か月未満	計4回 初回3回 追加1回	【1・2・3回目】 27日以上(標準：27~56日)の間隔をおく ※医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。 ※2回目および3回目が1歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可) 【4回目】 初回3回目終了後、7か月以上(標準：7~13か月)の間隔をおく ※初回接種が3回接種できなくても、追加接種は実施可能。その際は、初回接種の接種終了後27日以上の間隔をおく。また、医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。
		7か月未満をすぎた場合 初回開始が生後7か月~1歳未満	計3回 初回2回 追加1回	【1・2回目】 27日以上(標準：27~56日)の間隔をおく ※医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。 ※2回目が1歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可) 【3回目】 初回2回目終了後、7か月以上(標準：7~13か月)の間隔をおく ※初回接種が2回接種できなくても、追加接種は実施可能。その際は、初回1回目の接種終了後27日以上の間隔をおく。また、医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。
	7か月未満をすぎた場合 初回開始が1歳~5歳未満	1回		
BCG(生)	1歳未満	生後5か月~8か月未満	1回	
麻しん風しん混合(MR)(生)	1歳~2歳未満		計2回 1期1回	【1回目】
	小学校就学前の年長児 (令和8年度対象者：令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれの方)		2期1回	【2回目】 令和8年4月1日~令和9年3月31日に1回
水痘(水ぼうそう)(生)	1歳~3歳未満	初回接種が1歳~1歳3か月未満	2回	【1・2回目】 3か月以上(標準：半年~1年)の間隔をおく
日本脳炎	生後6か月~7歳6か月未満	3歳~4歳未満	計3回 1期初回2回 1期追加1回	【1・2回目】 6日以上(標準：6~28日)の間隔をおく
		4歳~5歳未満		【3回目】 1期初回2回目終了後、6か月以上(標準：おおむね1年)の間隔をおく
	9歳~13歳未満	9歳~10歳未満	2期1回	※予診票は9歳のお誕生日月末に発送
2種混合(ジフテリア・破傷風)	11歳~13歳未満	11歳~12歳未満	1回	※予診票は11歳のお誕生日月末に発送
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) <small>※接種開始時期により接種回数異なります。</small>	小学校6年生~高校1年生相当の女子 令和8年度対象者：平成22年4月2日~平成27年4月1日生まれの女子 (予診票は小学6年生の年度初めに発送)		2回 または 3回	※1回目の接種を15歳未満で接種する場合 【1・2回目】 6か月の間隔をおく ※1回目の接種を15歳以上で接種する場合 【1・2回目】 2か月の間隔をおく 【3回目】 1回目から6か月の間隔をおく

合計2回
合計3回