



≪接種間隔の考え方≫



27日の間隔：接種日を含まず、間の日数のみを数える。
火曜日に接種した場合、4週間後の同じ曜日（火曜日）以降に接種する。

■対象年齢：○歳(○か月)未満とは、○歳(○か月)になる前日まで接種可能です。

※標準接種期間・間隔を過ぎてても対象年齢内であれば、予診票を利用し無料で接種できます。

■異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔：

「注射の生ワクチン(生)」を接種後に、「注射の生ワクチン(生)」を接種するときは、27日以上の間隔をおいてください。

種類		対象年齢	標準的な接種期間	接種回数	接種間隔(赤字は最短の接種期間)・その他		
ロタウイルス	ロタリックス(1価)	出生6週0日～24週0日まで	初回接種が 生後2か月～出生14週6日	2回	【1・2回目】 27日以上の間隔をおく	ロタウイルスワクチンは2種類あり、いずれも同様の効果があります。2つのワクチンは接種回数が異なります。最初に受けたワクチンと同じ種類のワクチンを接種してください。	
	ロタテック(5価)	出生6週0日～32週0日まで		3回	【1・2・3回目】 27日以上の間隔をおく		
B型肝炎		1歳未満	生後2か月～9か月未満	3回	【1・2回目】 27日以上の間隔をおく 【3回目】 1回目の接種から139日以上の間隔をおく		
ヒブ ※接種開始時期により接種回数が異なります。 ※令和6年4月1日から5種混合ワクチンが始まりますが、ヒブワクチンを単独で接種開始している場合、原則、同一のワクチンで接種完了してください。		生後2か月～5歳未満	【標準】 初回開始が生後2か月～7か月未満	計4回 初回3回 追加1回	【1・2・3回目】 27日以上(標準：27～56日)の間隔をおく ※医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。 ※2回目および3回目が1歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可)		
			7か月をすぎた場合	初回開始が生後7か月～1歳未満	計3回 初回2回 追加1回		【1・2回目】 27日以上(標準：27～56日)の間隔をおく ※医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。 ※2回目が1歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可)
				初回開始が1歳～5歳未満	1回		【3回目】 初回2回目終了後、7か月以上(標準：7～13か月)の間隔をおく ※初回接種が2回接種できなくても、追加接種は実施可能。その際は、初回1回目の接種終了後27日以上の間隔をおく。また、医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。
小児肺炎球菌感染症 ※接種開始時期により接種回数が異なります。 ※令和6年4月1日からPCV15にワクチンが切り替わりますが、従来のPCV13と交互接種も可能です。使用するワクチンについては医療機関とご相談ください。		生後2か月～5歳未満	【標準】 初回開始が生後2か月～7か月未満	計4回 初回3回 追加1回	【1・2・3回目】 27日以上の間隔をおく(標準：1歳未満) ※2回目および3回目が2歳を超えた場合は行わない。2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない。(いずれも追加接種は可)		
			7か月をすぎた場合	初回開始が生後7か月～1歳未満	計3回 初回2回 追加1回		【4回目】 初回3回目終了後、60日以上の間隔をおいて、かつ、1歳以降(標準：1歳～1歳3か月未満) ※初回接種が3回接種できなくても、追加接種は実施可能。その際は、初回接種の接種終了後60日以上の間隔をおく。
				初回開始が1歳～2歳未満	2回		【1・2回目】 27日以上の間隔をおく(標準：1歳未満) ※2回目が2歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可)
4種混合 (ジフテリア・破傷風 百日せき・ポリオ)		生後2か月～7歳6か月未満	初回接種が生後2か月～1歳未満	計4回 初回3回 追加1回	【1・2・3回目】 20日以上(標準：20～56日)の間隔をおく		
			1期初回3回接種後1年～1年半の間隔をおいて1回		【4回目】 1期初回3回目終了後、6か月以上(標準：1年～1年6か月未満)の間隔をおく		
			5種混合(R6, 4, 1～) (ジフテリア・破傷風 百日せき・ポリオ ヒブ)	生後2か月～7歳6か月未満	計4回 初回3回 追加1回		【1・2・3回目】 20日以上(標準：20～56日)の間隔をおく
BCG(生)		1歳未満	生後5か月～8か月未満	1回			
			1歳～2歳未満	計2回 1期1回 2期1回	【1回目】 【2回目】 令和6年4月1日～令和7年3月31日に1回		
			小学校就学前の年長児 (令和6年度対象者：平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれの方)				
水痘(水ぼうそう)(生)		1歳～3歳未満	初回接種が1歳～1歳3か月未満	2回	【1・2回目】 3か月以上(標準：半年～1年)の間隔をおく		
日本脳炎		生後6か月～7歳6か月未満	3歳～4歳未満	計3回 1期初回2回 1期追加1回	【1・2回目】 6日以上(標準：6～28日)の間隔をおく		
			4歳～5歳未満		【3回目】 1期初回2回目終了後、6か月以上(標準：おおむね1年)の間隔をおく		
		9歳～13歳未満	9歳～10歳未満	2期1回	※予診票は9歳のお誕生日末に発送		
日本脳炎経過措置		接種勧奨の差し控えにより日本脳炎予防接種を受けていない平成16年4月2日～平成19年4月1日生まれて20歳未満の方(計4回の接種)					
2種混合 (ジフテリア・破傷風)		11歳～13歳未満	11歳～12歳未満	1回	※予診票は11歳のお誕生日末に発送		
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)	サーバリックス(2価)	小学校6年生～高校1年生相当の女子 令和6年度対象者：平成20年4月2日～平成25年4月1日生まれの女子 (予診票は小学6年生の年度内に発送) ※平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれの女性も令和7年3月末まで定期接種として接種できます。	3回 ※シルガード9は、接種開始時期により回数が異なります。	【1・2回目】 1か月の間隔をおく 【3回目】 1回目から6か月の間隔をおく	(2価)		
	ガーダシル(4価)			【1・2回目】 2か月の間隔をおく 【3回目】 1回目から6か月の間隔をおく	(4価)		
	シルガード9(9価)			※1回目の接種を15歳未満で接種する場合 【1・2回目】 6か月の間隔をおく ※1回目の接種を15歳以上で接種する場合 【1・2回目】 2か月の間隔をおく 【3回目】 1回目から6か月の間隔をおく	合計2回 合計3回 (9価)		