




■対象年齢：○歳(○か月)未満とは、○歳(○か月)になる前日まで接種可能です。  
 ※標準接種期間・間隔を過ぎてても対象年齢内であれば、予診票を利用し無料で接種できます。

■異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔：  
 「注射の生ワクチン(生)」を接種後に、「注射の生ワクチン(生)」を接種するときは、27日以上の間隔をおいてください。

＜接種間隔の考え方＞



種類		対象年齢	標準的な接種期間	接種回数	接種間隔(赤字は最短の接種期間)・その他	
ロタウイルス	ロタリックス(1価)	出生6週0日～24週0日まで	初回接種が 生後2か月～出生14週6日	2回	【1・2回目】 27日以上の間隔をおく	
	ロタテック(5価)	出生6週0日～32週0日まで		3回	【1・2・3回目】 27日以上の間隔をおく	
B型肝炎		1歳未満	生後2か月～9か月未満	3回	【1・2回目】 27日以上の間隔をおく 【3回目】 1回目の接種から139日以上の間隔をおく	
ヒブ  ※接種開始時期により接種回数が異なります。生後7か月までに接種を開始することをお勧めします。また、接種回数及び接種間隔にご注意ください。		生後2か月～5歳未満	【標準】 初回開始が生後2か月～7か月未満	計4回	初回3回	【1・2・3回目】 27日以上(標準：27～56日)の間隔をおく ※医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。 ※2回目および3回目が1歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可)
			追加1回	【4回目】 初回3回目終了後、7か月以上(標準：7～13か月)の間隔をおく ※初回接種が3回接種できなくても、追加接種は実施可能。その際は、初回接種の接種終了後27日以上の間隔をおく。また、医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。		
		7か月をすぎた場合	初回開始が生後7か月～1歳未満	計3回	初回2回	【1・2回目】 27日以上(標準：27～56日)の間隔をおく ※医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。 ※2回目が1歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可)
			追加1回	【3回目】 初回2回目終了後、7か月以上(標準：7～13か月)の間隔をおく ※初回接種が2回接種できなくても、追加接種は実施可能。その際は、初回1回目の接種終了後27日以上の間隔をおく。また、医師が必要と認める場合は20日以上の間隔で接種可。		
小児肺炎球菌感染症  ※接種開始時期により接種回数が異なります。生後7か月までに接種を開始することをお勧めします。また、接種回数及び接種間隔にご注意ください。		生後2か月～5歳未満	【標準】 初回開始が生後2か月～7か月未満	計4回	初回3回	【1・2・3回目】 27日以上の間隔をおく(標準：1歳未満) ※2回目および3回目が2歳を超えた場合は行わない。2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない。(いずれも追加接種は可)
			追加1回	【4回目】 初回3回目終了後、60日以上の間隔をおいて、かつ、1歳以降(標準：1歳～1歳3か月未満) ※初回接種が3回接種できなくても、追加接種は実施可能。その際は、初回接種の接種終了後60日以上の間隔をおく。		
		7か月をすぎた場合	初回開始が生後7か月～1歳未満	計3回	初回2回	【1・2回目】 27日以上の間隔をおく(標準：1歳未満) ※2回目が2歳を超えた場合は行わない。(追加接種は可)
			追加1回	【3回目】 初回2回目終了後、60日以上の間隔をおいて、かつ、1歳以降(標準：1歳～1歳3か月未満) ※初回接種が2回接種できなくても、追加接種は実施可能。その際は、初回1回目の接種終了後60日以上の間隔をおく。		
4種混合(ジフテリア・破傷風 百日せき・ポリオ)		生後2か月～7歳6か月未満	生後2か月～1歳未満	計4回	1期初回3回	【1・2・3回目】 20日以上(標準：20～56日)の間隔をおく
			1期初回3回接種後1年～1年半の間隔をおいて1回	1期追加1回	【4回目】 1期初回3回目終了後、6か月以上(標準：1年～1年6か月未満)の間隔をおく	
			BCG(生)	1歳未満	生後5か月～8か月未満	1回
麻しん風しん混合(MR)(生)		1歳～2歳未満	小学校就学前の年長児を対象に令和5年4月1日～令和6年3月31日の1年間に接種	計2回	1期1回	【1回目】
			令和5年度対象者：平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれの方	2期1回	【2回目】	
水痘(水ぼうそう)(生)		1歳～3歳未満	初回接種が1歳～1歳3か月未満	2回	【1・2回目】 3か月以上(標準：半年～1年)の間隔をおく	
日本脳炎		生後6か月～7歳6か月未満	3歳～4歳未満	計3回	1期初回2回	【1・2回目】 6日以上(標準：6～28日)の間隔をおく
			4歳～5歳未満		1期追加1回	【3回目】 1期初回2回目終了後、6か月以上(標準：おおむね1年)の間隔をおく
		9歳～13歳未満	9歳～10歳未満	2期1回	※予診票は9歳のお誕生日月末に発送	
日本脳炎経過措置		平成15年4月2日～平成19年4月1日生まれて20歳未満の方 接種勧奨の差し控えにより日本脳炎予防接種を受けることができなかった方について、経過措置として20歳のお誕生日の前日まで定期予防接種として未接種分を接種できます。(計4回の接種)				
2種混合(ジフテリア・破傷風)		11歳～13歳未満	11歳～12歳未満	2期1回	※予診票は11歳のお誕生日月末に発送	
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)	サーバリックス(2価)	小学校6年生～高校1年生相当の女子 令和5年度対象者：平成19年4月2日～平成24年4月1日生まれの女子 ※平成9年4月2日～平成19年4月1日生まれの女性も令和7年3月31日まで定期接種として接種できます。 ※予診票は小学6年生の年度末に発送		3回 ※シルガード9は、1回目の接種を15歳未満で接種する場合は2回	【1・2回目】 1か月の間隔をおく 【3回目】 1回目から6か月の間隔をおく (2価)	
	ガーダシル(4価)				【1・2回目】 2か月の間隔をおく 【3回目】 1回目から6か月の間隔をおく (4価)	
	シルガード9(9価)				※1回目の接種を15歳未満で接種する場合 【1・2回目】 6か月の間隔をおく ※1回目の接種を15歳以上で接種する場合 【1・2回目】 2か月の間隔をおく 【3回目】 1回目から6か月の間隔をおく	
				合計2回 (9価)		
				合計3回		