

定期接種の標準的なスケジュール（令和6年4月現在）

予防接種の種類	出生	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	～	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳6か月	
ロタウイルス	ロタリックス（2回） （経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン）		↓1回目	↓2回目															
	ロタテック（3回） （5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン）		↓1回目	↓2回目	↓3回目														
B型肝炎			↓1回目	↓2回目	<1回目から139日以上の間隔>					↓3回目									
ヒブ			↓1回目	↓2回目	↓3回目	<3回目から7～13か月の間隔>					追加								
小児肺炎球菌			↓1回目	↓2回目	↓3回目	<3回目から60日以上の間隔で、1歳以降に>					追加								
4種混合・5種混合			↓1回目	↓2回目	↓3回目	<3回目から1年～1年半の間隔> （最短で6か月おいて）					追加								
BCG																			
麻しん・風しん（MR）											↓1期								
水痘（水ぼうそう）											↓1回目	↓2回目							
日本脳炎																			

ヒブ、小児肺炎球菌は接種開始年齢により、接種回数が異なります。

小学校就学前の年長児



…標準的な接種タイミング


※ ロタウイルスワクチンは2種類あり、いずれも同様の効果があります。

2つのワクチンは接種回数が異なります。最初に受けたワクチンと同じ種類のワクチンを接種してください。

※ 〇歳（〇か月）未満とは、〇歳（〇か月）になる前日が接種可能な最終日です。

【接種間隔】接種日は含まず、間の日数を数えます。

「27日以上あける」は以下のように数えます。




【異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔】

注射生ワクチンと別の注射生ワクチンを接種する場合、27日以上の間隔をあける必要があります。

注射生ワクチン

- ・ BCG
- ・ 麻しん風しん混合
- ・ 水痘
- ・ おたふくかぜ（任意接種）



注射生ワクチン

- ・ BCG
- ・ 麻しん風しん混合
- ・ 水痘
- ・ おたふくかぜ（任意接種）

※ 同じワクチンを複数回接種する場合、それぞれ定められた接種間隔があります。